



Rosa Indica Caryophyllæa. *La Bengale Oeillet.*

P.L. Redouté pinx.

Supplément de Beauvais.

Langlois sculp.

LES ROSES.

69

ROSA INDICA CARYOPHILLEA.

R. perminibus ovatis, glabris; pedicellis hispido-glandulosis, cyma trifida. (N.)

LE BENGAL-ŒILLET.

DESCRIPTION.

C'est un arbrisseau très-élégant, qui s'élève à la hauteur de quinze à vingt pouces au plus. Les rameaux florifères sont, assez généralement, dépourvus d'aiguillons; les rameaux adultes en présentent quelques-uns, assez petits et recourbés. Les feuilles se composent de cinq folioles glabres, vertes en-dessus, plus pâles en-dessous, l'impaire très-aiguë, à dentelure crénelée, chaque dent surmontée d'une petite glande. Elles sont portées par un pétiole glanduleux nu, en-dessous, de quelques petits aiguillons rougeâtres et crochus; à sa base sont deux stipules bilobes et pointues au sommet, densiculées en leur bord. Les fleurs, légèrement odorantes, presque aussi doubles que celles du *R. des Indes-Cent-feuilles*, naissent par trois à l'extrémité des rameaux où elles se réunissent en une espèce d'ombelle. Le tube du calice est ovoïde, glabre, et marqué de quelques cannelures longitudinales. Le pédoncule commun est glabre, mais les pédicelles sont hispides-glanduleux. A la base de chaque pédicelle se trouvent des stipules longues et étroites. Les divisions du limbe sont simples, pointues au sommet, à bordure garnie de petites glandes sessiles. Corolle de huit à dix rangs de pétales, d'un beau rose assez foncé, quelques-uns traversés